

## Často kladené otázky – očkování proti COVID-19 ve FNUSA

### 1. Jakou očkovací látku používáme?

Očkujeme vakcínou od firmy Pfizer – BioNTech, komerční název vakcíny je Comirnaty. Jiné očkovací látky na našich centrech nepodáváme.

### 2. Která očkovací centra Fakultní nemocnice U sv. Anny provozuje?

Očkujeme jednak přímo v nemocnici (očkovací centrum v budově A5) a dále provozujeme očkovací centrum Hustopeče – Společenský dům.

### 3. Jak dlouho budu čekat na termín? Kde najdu informace o vytíženosti jednotlivých očkovacích center v ČR?

Informace o vytíženosti jednotlivých očkovacích míst naleznete zde: [ockoreport.uzis.cz](http://ockoreport.uzis.cz).

### 4. Kdy obdržím termín 2. dávky očkování?

Termín 2. dávky se dozvíte automaticky ihned po aplikaci 1. dávky.

### 5. Mohu si ve Vašich centrech vybrat i jinou vakcínu?

Očkujeme pouze jedním typem vakcíny, jinou vakcínu si vybrat nelze. V ČR obecně zatím platí, že si nelze vybrat vakcínu.

### 6. Pro koho je vakcína určena?

Vakcína je dle schválení registračních orgánů (EMA, SÚKL) určena pro jedince ve věku nad 16 let, dětem do 16 let vakcína zatím být podána nemůže.

### 7. V jakém schématu je vakcína podávána?

K plnému účinku vakcíny je potřeba podat 2 dávky v rozestupu 42 dní (6 týdnů).

### 8. Musí být interval přesně 42 dní (6 týdnů)?

V rámci centrálního objednávacího systému je Vám při první dávce automaticky vytvořen i termín druhé dávky za 42 dní. Může se ale stát, že z nějakého vážného důvodu termín nemůžete dodržet. V tomto případě kontaktujte linku podpory 1221 nebo naše informační centrum na tel. č. 543 185 555. Prodloužení intervalu o několik dní nemá na účinnost očkování význam, nicméně významné oddálení druhé dávky může vést ke snížení imunitní odpovědi organismu. Není ale možné opakovaně měnit zaregistrované termíny bez závažného důvodu.

### 9. Mohu požadovat aplikaci druhé dávky dříve (např. v původním odstupu 21 dní)?

Očkování může být výjimečně podáno o několik málo dní dříve, ale pouze v závažných případech a po individuálním schválení vedoucím očkovacího centra. Požadovat interval 21 dní nelze.

**10. Mohu požadovat na druhou dávku jinou vakcínu, než která mi byla podána jako dávka první?**

Tento postup v žádném případě není možný, mohlo by dojít k negativnímu ovlivnění Vašeho zdravotního stavu. Navíc by nedošlo k rozvinutí ochrany proti koronaviru.

**11. Kdy začíná očkování fungovat, tj. kdy mohu očekávat nějakou ochranu proti koronavirové infekci?**

14 dní po první dávce se udává účinnost očkování kolem 60 %, která už může chránit před rizikem úmrtí. Plný efekt vakcinace se ale rozvine 7–14 dní po druhé dávce, účinnost je udávána kolem 95–98 %. Z důvodu dosažení vysoké ochrany je nutno podat i druhou dávku.

**12. Mohu dostat COVID-19 z vakcíny?**

Určitě ne, pokud COVID-19 po aplikaci vakcíny dostanete, znamená to, že jste se nakazil/a ještě před očkováním nebo bezprostředně po něm, kdy jste ještě neměl/a vytvořenou dostatečnou imunitu.

**13. Je druhá dávka stejná jako první?**

Ano, obě dávky jsou identické. U vakcíny, kterou se očkuje ve FNUSA, je to vždy minimální objem 0,3 ml (Comirnaty).

**14. Jak dlouho vydrží protilátky po očkování a kdy po 2. dávce budu chráněn?**

Protilátky vydrží alespoň 8 měsíců, ale pravděpodobně mnohem déle. 7 dní po 2. dávce očkování vakcínou od firmy Pfizer existuje 95% pravděpodobnost, že onemocnění nevznikne.

**15. Proč se doporučuje očkovat i po prodělaném onemocnění COVID?**

Protože se tvorba protilátek po prodělaném onemocnění u pacientů liší a jejich hladina pak nemusí být dostatečná, aby Vás dále dostatečně chránila před novým onemocněním. Platí to zvláště u starších osob a u nemocných s imunosupresí. Navíc se nyní zjistilo, že v těchto případech očkování zajistí lepší ochranu proti novým mutacím koronaviru.

**16. Musím používat roušku i po očkování?**

Ano. Vládní nařízení se prozatím nezměnila.

**17. Potřebuji před vakcínou test na COVID-19?**

Nepotřebujete.

**18. Měl bych být testován na protilátky proti COVID-19, abych zjistil, zda mám dostat vakcínu?**

Není to nutné, nevíme, jaká hladina protilátek je dostatečná.

**19. Dostanu o očkování nějaké potvrzení?**

Po podání **druhé dávky** Vám bude elektronicky na Vámi udaný e-mail zaslán **certifikát o vakcinaci**. Soubor je zasílán chráněný heslem, které současně obdržíte na Vaše telefonní číslo. Na požádání také certifikát vytiskneme a předáme Vám v papírové podobě.

## **20. Jsou údaje o mém očkování někde uloženy?**

Údaje o Vaší vakcínami jsou zaneseny do centrálního registru ISIN MZ ČR. Údaje si můžete ověřit a certifikát opakovaně stáhnout na Očkovacím portálu občana na adrese [www.ocko.uzis.cz](http://www.ocko.uzis.cz).

## **Kdy nemohu být očkován/a – kontraindikace očkování**

**Očkování je indikováno pro občany ČR a případně EU, kteří splňují aktuálně platná kritéria očkovací strategie ČR (věkový limit, vybrané rizikové skupiny)**

1. Po **prokázané infekci koronavirem** nemohu být očkován dříve než za 90 dní po průkazu infekce.
2. Očkovat není možné v průběhu **izolace a karantény**. Očkování lze zahájit bezprostředně po ukončení karantény.
3. Očkování by mělo být odloženo o 3 měsíce po aplikaci monoklonálních protilátek proti SARS-CoV-2 nebo rekonvalescentní plazmy.
4. Osobám, které onemocněly COVID-19 po aplikaci první dávky, se doporučuje odložit podání druhé dávky o 3 měsíce po odeznění příznaků nebo ukončení izolace.
5. Očkovat není možné v průběhu **akutního horečnatého onemocnění**.
6. **Očkování těhotných žen** v současnosti není možné pro nedostatek informací o reakci těhotných na vakcínu, ale lze očekávat v budoucí době dokončení studií a je předpokládáno schválení i pro těhotné ženy. Aplikace **kojícím maminkám provádíme**.
7. Očkován nemohu být, pokud jsem **dostal/a jiné očkování před méně než 14 dny** (například očkování proti klíšťové encefalitidě).
8. Očkování není možné, pokud jsem prodělal/a **těžkou alergickou (anafylaktickou) reakci až šok** po první dávce vakcíny nebo po jiné vakcíně shodného typu, **u mírnějších alergických reakcí na očkování** je doporučeno vyjádření ošetřujícího alergologa a v našem centru ještě Vaši situaci posoudí lékař-alergolog. Jiné alergie kontraindikací očkování nejsou.
9. Očkovat není vhodné při celkovém závažném stavu a v terminální fázi života – aktuální situaci pacienta by měl vždy posoudit jeho praktický/ ošetřující lékař.
10. V případě, že **si nejste jisti**, zda je ve Vašem zdravotním stavu očkování vhodné, poraďte se vždy s **Vaším praktickým lékařem nebo jiným lékařem, který nejlépe zná Váš zdravotní stav**, a jeho vyjádření si přineste k očkování (např. od ošetřujícího onkologa). Tuto situaci nelze řešit až v očkovacím centru, jehož lékaři o Vás dlouhodobě nepečují.
11. Zatím nelze žádat očkování **jako samoplátce**, v případě změny budeme informovat.

## Co dělat před očkováním – mám se nějak připravovat?

- **Specifická příprava před očkováním není doporučena**, a to ani u pacientů s alergiemi v anamnéze (výjimka z postupu je u anafylaktických reakcí – viz odstavec kontraindikace očkování).
- Užijte svoji **chronickou medikaci beze změny, nevysazujte** žádné léky snižující krevní srážlivost (léky na ředění krve), ale ani si žádné léky z této skupiny nově nenasazujte.
- Těsně před očkováním **není vhodná velká fyzická zátěž ani požití alkoholu**.

## Co mohu očekávat po očkování, jaké jsou nejčastější reakce po očkování?

- Po aplikaci vakcíny zůstáváte 15 minut pod dohledem zdravotníků v očkovacím centru pro případ akutní alergické reakce (alergici až 30 minut).
- U řady očkovaných nezaznamenáváme žádnou reakci na očkování.
- V odstavu hodin až 1–3 dnů se může objevit **místní reakce – otok, zarudnutí a bolestivost** v místě vpichu, zduření mízních uzlin v podpaží nebo **celková reakce na očkování** – únava, bolesti svalů, kloubů, zvýšená spavost, zvýšená teplota až horečka, zimnice. Vzácně se vyskytují nevolnost, zvracení a průjemy. Možný je také výsev červených skvrn a vyrážek na kůži. Vzácně se může vyskytnout pocit dušnosti a ztížené dýchání, bušení srdce, točení hlavy a otoky v oblasti dýchacích cest (obličej, rty, jazyk, hrtan). Příznaky většinou samovolně odeznějí do několika dnů, při teplotách nad 38 st. a/nebo výrazné bolestivosti je doporučeno užít léky s obsahem paracetamolu (Paralen, Panadol). Zduření a otok v místě vpichu lze tlumit chlazením. Další kroky konzultujte případně se svým praktickým lékařem.
- Reakce se může objevit po první i po druhé dávce v různém stupni vyjádření. V případě závažných příznaků (zejména otoků obličeje a dýchacích cest, dušnosti, poklesu krevního tlaku a zrychlení srdeční činnosti volejte záchrannou službu – 155).  
Hlášení na podezření na nežádoucí účinky je možné také zaslat přímo Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Podrobnosti k hlášení jsou zde: <https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek>.
- Po očkování není po dobu **24 hodin vhodná těžká fyzická aktivita** a požívání většího množství **alkoholu, jinak Vaše aktivity nemusíte nijak omezovat**, resp. pouze s ohledem na Váš celkový zdravotní stav a reakci organismu na očkování.