

Často kladené otázky – očkování proti COVID-19 ve FNUSA

1. Která očkovací centra Fakultní nemocnice U sv. Anny provozuje?

Očkujeme přímo v nemocnici (očkovací centrum v budově A5, od 3. ledna 2022 přesunuto do Millenium Center na ulici Hybešova) a dále provozujeme očkovací centrum v OC Olympia Brno.

2. Jakou očkovací látku používáme?

Očkujeme vakcínou Comirnaty od firmy Pfizer – BioNTech. V očkovacím centru v OC Olympia Brno kromě Comirnaty nabízíme také vakcínu Janssen od firmy Johnson & Johnson.

3. Jak dlouho budu čekat na termín? Kde najdu informace o vytíženosti jednotlivých očkovacích center v ČR?

Informace o vytíženosti jednotlivých očkovacích míst naleznete zde: ockoreport.uzis.cz.

4. Kdy obdržím termín 2. dávky očkování?

Termín 2. dávky se dozvíte automaticky ihned po aplikaci 1. dávky.

5. Mohu si ve Vašich centrech vybrat i jinou vakcínu?

Vybrat si lze v očkovacím centru v OC Olympia Brno mezi vakcínami Comirnaty a Janssen. V očkovacím centru v nemocnici si vybrat nelze, očkujeme pouze Comirnaty.

6. Mohu se nechat očkovat jako samoplátce?

Ano, cena za jednu dávku vakcíny je 400 Kč. Platí pro oba druhy podávaných vakcín.

7. Jsem těhotná, mohu se nechat očkovat?

Při indikaci očkování proti onemocnění COVID-19 u těhotných žen je nutno postupovat individuálně a vždy pečlivě posoudit míru rizika pro ženu a předpokládaný přínos pro ženu i dítě. V současné době není k dispozici dostatek klinických údajů o rizicích a nežádoucích účincích vakcíny v průběhu těhotenství, na druhé straně riziko závažného průběhu onemocnění COVID-19 je pro těhotné vyšší. Pro rozhodnutí, zda očkovat v těhotenství, je přínosné přinést si vyjádření gynekologa, který o Vás v průběhu těhotenství pečuje. Toto vyjádření je důležité kritérium pro rozhodnutí, zda je pro Vás očkování v graviditě vhodné. Aplikace **kojícím maminkám provádíme**.

8. V jakém schématu je vakcína podávána?

K plnému účinku vakcíny Comirnaty je potřeba podat 2 dávky v rozestupu 21 dnů. Šest měsíců po druhé dávce je doporučena třetí posilovací dávka.

9. Musí být interval mezi dávkami dodržen přesně?

V rámci centrálního objednávacího systému je Vám při první dávce automaticky vytvořen i termín druhé dávky. Může se ale stát, že z nějakého vážného důvodu termín nemůžete dodržet. V tomto případě kontaktujte linku podpory 1221 nebo naše informační centrum na tel. č. 543 185 555. Prodloužení intervalu o několik dní nemá na účinnost očkování význam, nicméně významné oddálení druhé dávky může vést ke snížení imunitní odpovědi organismu. Není ale možné opakovaně měnit zaregistrované termíny bez závažného důvodu.

10. Kdy začíná očkování fungovat, tj. kdy mohu očekávat nějakou ochranu proti koronavirové infekci?

14 dní po první dávce se udává účinnost očkování kolem 60 %, která už může chránit před rizikem úmrtí. Plný efekt vakcinace se ale rozvine 7–14 dní po druhé dávce, účinnost je udávána kolem 95–98 %. Z důvodu dosažení vysoké ochrany je nutno podat i druhou dávku.

11. Mohu dostat COVID-19 z vakcíny?

Určitě ne, pokud COVID-19 po aplikaci vakcíny dostanete, znamená to, že jste se nakazil/a ještě před očkováním nebo bezprostředně po něm, kdy jste ještě neměl/a vytvořenou dostatečnou imunitu.

12. Je druhá dávka stejná jako první?

Ano, obě dávky jsou identické. U vakcíny, kterou se očkuje ve FNUSA, je to vždy minimální objem 0,3 ml (Comirnaty).

13. Jak dlouho vydrží protilátky po očkování a kdy po 2. dávce budu chráněn?

Protilátky vydrží alespoň 8 měsíců, ale pravděpodobně mnohem déle. 7 dní po 2. dávce očkování vakcínou od firmy Pfizer existuje 95% pravděpodobnost, že onemocnění nevznikne.

14. Proč se doporučuje očkovat i po prodělaném onemocnění COVID-19?

Protože se tvorba protilátek po prodělaném onemocnění u pacientů liší a jejich hladina pak nemusí být dostatečná, aby Vás dále dostatečně chránila před novým onemocněním. Platí to zvláště u starších osob a u nemocných s imunosupresí. Navíc se nyní zjistilo, že v těchto případech očkování zajistí lepší ochranu proti novým mutacím koronaviru.

16. Musím používat roušku i po očkování?

Ano. Vládní nařízení se prozatím nezměnila.

17. Potřebuji před vakcínou test na COVID-19?

Nepotřebujete.

18. Měl bych být testován na protilátky proti COVID-19, abych zjistil, zda mám dostat vakcínu?

Není to nutné, nevíme, jaká hladina protilátek je dostatečná.

19. Dostanu o očkování nějaké potvrzení?

Na Vámi uvedený e-mail obdržíte elektronický **certifikát o vakcinaci**. Soubor je zasílán chráněný heslem, které současně obdržíte na Vaše telefonní číslo. Na požádání také certifikát vytiskneme a předáme Vám v papírové podobě.

20. Jsou údaje o mém očkování někde uloženy?

Údaje o Vaší vakcinaci jsou zaneseny do centrálního registru ISIN MZ ČR. Údaje si můžete ověřit a certifikát opakovaně stáhnout na Očkovacím portálu občana na adrese www.ocko.uzis.cz.

Kdy nemohu být očkován/a – kontraindikace očkování

Očkování je indikováno pro občany ČR a případně EU, kteří splňují aktuálně platná kritéria očkovací strategie ČR (věkový limit, vybrané rizikové skupiny)

1. Po **prokázané infekci koronavirem** nemohu být očkován dříve než za 90 dní po průkazu infekce.
2. Očkovat není možné v průběhu **izolace a karantény**. Očkování lze zahájit bezprostředně po ukončení karantény.
3. Očkování by mělo být odloženo o 3 měsíce po aplikaci monoklonálních protilátek proti SARS-CoV-2 nebo rekonvalescentní plazmy.
4. Osobám, které onemocněly COVID-19 po aplikaci první dávky, se doporučuje odložit podání druhé dávky o 3 měsíce po odeznění příznaků nebo ukončení izolace.
5. Očkovat není možné v průběhu **akutního horečnatého onemocnění**.
6. Očkován nemohu být, pokud jsem **dostal/a jiné očkování před méně než 14 dny** (například očkování proti klíšťové encefalitidě).
7. Očkování není možné, pokud jsem prodělal/a **těžkou alergickou (anafylaktickou) reakci až šok** po první dávce vakcíny nebo po jiné vakcíně shodného typu, **u mírnějších alergických reakcí na očkování** je doporučeno vyjádření ošetřujícího alergologa a v našem centru ještě Vaši situaci posoudí lékař-alergolog. Jiné alergie kontraindikací očkování nejsou.
8. Očkovat není vhodné při celkovém závažném stavu a v terminální fázi života – aktuální situaci pacienta by měl vždy posoudit jeho praktický/ ošetřující lékař.
9. V případě, že **si nejste jisti**, zda je ve Vašem zdravotním stavu očkování vhodné, poraďte se vždy s **Vaším praktickým lékařem nebo jiným lékařem, který nejlépe zná Váš zdravotní stav**, a jeho vyjádření si přineste k očkování (např. od ošetřujícího onkologa). Tuto situaci nelze řešit až v očkovacím centru, jehož lékaři o Vás dlouhodobě nepečují.

Co dělat před očkováním – mám se nějak připravovat?

- **Specifická příprava před očkováním není doporučena**, a to ani u pacientů s alergiemi v anamnéze (výjimka z postupu je u anafylaktických reakcí – viz odstavec kontraindikace očkování).
- Užijte svoji **chronickou medikaci beze změny, nevysazujte** žádné léky snižující krevní srážlivost (léky na ředění krve), ale ani si žádné léky z této skupiny nově nenasazujte.
- Těsně před očkováním **není vhodná velká fyzická zátěž ani požití alkoholu.**

Co mohu očekávat po očkování, jaké jsou nejčastější reakce po očkování?

- Po aplikaci vakcíny zůstáváte 15 minut pod dohledem zdravotníků v očkovacím centru pro případ akutní alergické reakce (alergici až 30 minut).
- U řady očkovaných nezaznamenáváme žádnou reakci na očkování.
- V odstupě hodin až 1–3 dnů se může objevit **místní reakce – otok, zarudnutí a bolestivost** v místě vpichu, zduření mízních uzlin v podpaží nebo **celková reakce na očkování** – únava, bolesti svalů, kloubů, zvýšená spavost, zvýšená teplota až horečka, zimnice. Vzácně se vyskytují nevolnost, zvracení a průjmy. Možný je také výsev červených skvrn a vyrážek na kůži. Vzácně se může vyskytnout pocit dušnosti a ztížené dýchání, bušení srdce, točení hlavy a otoky v oblasti dýchacích cest (obličej, rty, jazyk, hrtan). Příznaky většinou samovolně odeznějí do několika dnů, při teplotách nad 38 st. a/nebo výrazné bolestivosti je doporučeno užít léky s obsahem paracetamolu (Paralen, Panadol). Zduření a otok v místě vpichu lze tlumit chlazením. Další kroky konzultujte případně se svým praktickým lékařem.
- Reakce se může objevit po první i po druhé dávce v různém stupni vyjádření. V případě závažných příznaků (zejména otoků obličeje a dýchacích cest, dušnosti, poklesu krevního tlaku a zrychlení srdeční činnosti volejte záchrannou službu – 155).
Hlášení na podezření na nežádoucí účinky je možné také zaslat přímo Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Podrobnosti k hlášení jsou zde: <https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek>.
- Po očkování není po dobu **24 hodin vhodná těžká fyzická aktivita** a požívání většího množství **alkoholu, jinak Vaše aktivity nemusíte nijak omezovat**, resp. pouze s ohledem na Váš celkový zdravotní stav a reakci organismu na očkování.